



FLOTTOZIMA® L

PREPARADO ENZIMÁTICO PARA CLARIFICAÇÃO
DE MOSTOS POR FLOTAÇÃO

COMPOSIÇÃO



Pool enzimático em solução com elevada atividade pectolítica, com formulação específica para clarificação de mostos através de flotação.

CARACTERÍSTICAS



FLOTTOZIMA® L apresenta-se na forma líquida. Foi desenvolvida para o uso enológico para obter reduções de viscosidade do meio e modificar a hidroflicidade das pectinas, facilitando a clarificação através da flotação

APLICAÇÕES



FLOTTOZIMA® L é utilizada no tratamento enzimático do mosto antes do processo de flotação.

O uso de FLOTTOZIMA® L deve respeitar as Normas nacionais e legais em vigor.



FLOTTOZIMA® L

PREPARADO ENZIMÁTICO PARA CLARIFICAÇÃO
DE MOSTOS POR FLOTAÇÃO



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Diluir a FLOTTOZIMA® L em uma pequena quantidade de mosto e acrescentar esta solução ao mosto total, logo imediatamente após a prensagem, assegurando uma boa homogeneização; é aconselhável manter o mosto em agitação durante o tratamento. FLOTTOZIMA® L exerce a sua ação entre os 10 e 30°C; a velocidade de ação da enzima aumenta neste intervalo, com o aumento da temperatura. No caso de temperaturas inferiores, para obter os mesmos resultados, é necessário aumentar a dose. A bentonite exerce um efeito de absorção das proteínas e conseqüentemente das enzimas; aconselha-se portanto proceder ao tratamento com bentonite, apenas quando a atividade enzimática estiver completada (em geral após 1-2 horas a temperatura de 20°C). Separar o mosto das partes solidas dentro de 5 horas após a aplicação da enzima. FLOTTOZIMA® L tolera teores de anidrido sulfuroso normalmente presentes nos mostos.



DOSES

0,5-5 gr/hL em mosto.



EMBALAGEM

Frascos de 1 kg.



CONSERVAÇÃO

Conservar num local fresco (10-15°C) e seco.
Fechar cuidadosamente os frascos depois de abertos.



IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

De acordo com as Normas atuais, o preparado é classificado: Xn – NOCIVO (*consultar a ficha de segurança*).

Está conforme o Codex Enológico Internacional, versão em vigor.